Fact Sheet - Serbian

КОНТРАЦЕПТИВНИ ИМПЛАНТ

The Contraceptive Implant



Шта је контрацептивни имплант?

Једини контрацептивни имплант који може да се набави у Аустралији је Implanon NXT®. То је мала пластична цевчица која садржи хормон прогестоден, који се полако ослобађа и спречава да затрудните. Имплант се поставља под кожу с унутрашње стране надлактице.



Оставља се 3 године али се може одстранити и раније.

Колико добро дејствује?

То је веома ефикасан метод за спречавање трудноће (ефикасан је више од 99.9%). Неки лекови могу да утичу да имплант постане мање ефикасан; зато је важно да обавестите свог лекара или медицинску сестру ако узимате друге лекове.

Ко може да користи имплант?

Већина жена може да користи имплант. Добар је за жене којима је тешко да се сете да сваки дан узму пилулу за контрацепцију. Одговара потребама жена које желе дугорочну и поуздану контролу рађања која се може брзо променити. Може се ставити одмах после порођаја, укључујући и жене које доје.

Ко не треба да користи имплант?

Не би требало да користите имплант ако сте имали рак дојке или имате одређене проблеме са јетром. Имплант вам можда неће одговарати ако сте склони стварању задебљалих (keloid) ожиљака, ако не желите да имате нешто под кожом, или се бринете због нередовних менструација.

Да ли постоје нека нежељена дејства?

Неке жене имају нередовна или продужена крварења. Менструације им могу потпуно престати. Друга нежељена дејства су ретка, међутим неке жене могу добити главобоље, промене расположења или могу имати осетљиве дојке.

Како се умеће имплант?

Лекар направи мали знак на кожи, са унутрашње стране надлактице. Он ће очистити кожу са антисептиком и убризгати мало анестетика, који може благо пећи, тако да уметање неће болети. Затим се имплант умеће непосредно испод коже и на руку се стави мали завој. Завој треба да остане на месу 24 сата. Око импланта може бити мало модро и болно, и то може потрајати до недељу дана.

Како се имплант одстрањује?

Лекар убризга малу количину анестетика испод завршетка импланта и направи мали рез на кожи.

Крај импланта се изгура кроз тај малени рез или се извуче напоље са малим инструментом.

Кад се имплант извади, контрацептивно деловање брзо нестаје. Већина жена добије нормалну менструацију у року од месец дана. Имплант мора да се одстрани након три године. Нови имплант може да се уметне чим се ранији одстрани.

Где могу добити имплант за контрацепцију?

Треба да одете код лекара који ће вам преписати имплант. Већина лекара ће разговарати са вама о томе приликом прве посете и затражити да поново дођете да вам га уметну. Имплант вам се може ставити у клиници за планирање породице (Family Planning clinic) или вам то може урадити локални лекар или медицинска сестра који су оспособљени за инсерцију.

За додатне информација

- Контактирајте линију за планирање породице (Family Planning NSW Talkline) на 1300 658 886 или идите на www.fpnsw.org.au/talkline
- NRS (за глуве) 133 677
- Или посетите најближу клинику за планирање породице



клиничке услуге и информације | едукација и обука | истраживање | међународни развој

Family Planning NSW је не-профитна организација коју финансира Министарство здравља Новог Јужног Велса

Информације у овом извештају предвиђене су само у едукативне сврхе. FNPNSW је предузело све мере да осигура да су информације тачне и актуелне у време објављивања. Појединци који су забринути за било који проблем везан за репродуктивно и сексуално здравље, треба да траже савет и помоћ од своје здравствене организације или да посете клинику за планирање продице. Рецензија мај 2014/FPNSW 05/14



Fact Sheet - English

THE CONTRACEPTIVE IMPLANT



What Is The Contraceptive Implant?

The only contraceptive implant available in Australia is called Implanon NXT®. It is a small plastic rod that contains a hormone, called a progestogen, which is slowly released to prevent you from getting pregnant. The implant is inserted just under the skin on the inside of your upper arm. It is left in place for 3 years but can be removed earlier if you choose.



How Well Does It Work?

It is a very effective method of preventing a pregnancy (more than 99.9% effective). Some medications can make the implant less effective; so it is important to tell your doctor or nurse if you are taking other medications.

Who Can Use An Implant?

Most women can use an implant. It is good for women who find it hard to remember to take a pill every day. Women who want long-term birth control that works well, but can be reversed quickly can find it suits them. It can be inserted immediately after giving birth, including in women who are breastfeeding.

Who Should Not Use An Implant?

You should not use an implant if you have had breast cancer or have certain liver problems. The implant may not suit you if you are prone to thickened (keloid) scarring, if you don't want to have something under your skin, or if you are worried about having irregular periods.

Are There Any Side Effects?

Some women get irregular or prolonged bleeding. Their periods may stop completely. Other side effects are rare, but some women may get headaches, mood changes, or have sore breasts.

How Is An Implant Inserted?

The doctor puts a small mark on the skin on the inside of your upper arm. They clean the skin with antiseptic, and inject a little anaesthetic, which might sting slightly, so that the insertion will not hurt. Then the implant is inserted just under the skin, and a small bandage is put on the arm. The bandage should stay in place for 24 hours. There may be some bruising and soreness around the implant that can last for up to a week.

How Is An Implant Removed?

The doctor injects a little anaesthetic just under the end of the implant, and makes a small cut in the skin.

The end of the implant is either pushed through the tiny cut, or pulled out using a small instrument.

The contraceptive effect wears off quickly when the implant is removed. Most women have a normal period within a month. The implant must be removed after three years. A new implant can be inserted as soon as one has been removed.

Where Can I Get A Contraceptive Implant?

You need to see a doctor to get a script for an implant. Most doctors will talk about it on your first visit and ask you to return for another visit to have it inserted. You can have an implant inserted at a Family Planning clinic or by a local doctor or nurse who has been trained to insert it.

For Further Information

- Contact the Family Planning NSW Talkline on 1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline
- NRS (for deaf) 133 677
- Or visit your nearest Family Planning clinic

www.fpnsw.org.au | talkline 1300 658 886 | bookshop

 $\label{lem:clinical services & information | education \& training | research | international development \\ \textit{Family Planning NSW} is a not-for-profit organisation funded by the NSW Ministry of Health \\ \\$





Reviewed: June 2014 | FPNSW 06/14

The information in this Factsheet has been provided for educational purposes only. Family Planning NSW has taken every care to ensure that the information is accurate and up-to-date at the time of publication. Individuals concerned about any personal reproductive or sexual health issue are encouraged to seek advice and assistance from their health care provider or visit an Family Planning NSW clinic.

www.fpnsw.org.au | talkline 1300 658 886 | bookshop

 $\label{lem:clinical services & information | education \& training | research | international development \\ \textit{Family Planning NSW} is a not-for-profit organisation funded by the NSW Ministry of Health \\ \\$

