

# Fact Sheet - Khmer

## ការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូន Tubal Sterilisation



### តើអ្វីជាការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូន?

ការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូនគឺជាការកាត់ដៃលស្រ្តីអាចមាន ហេតុនេះពួកគេមិនក្លាយជាមានគភ៌។ វាជាទំរង់អចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃការមិន អោយមានកូន។

### តើការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូនមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?


ការកាត់ទប់យ៉ាងដៃស្បូនរបស់ស្រ្តី ហេតុនេះហើយមេជីវិតរបស់បុរសមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ជួបពងទឹកកាមស្រ្តី (ពង) បាននិងចាប់ផ្តើម ការមានគភ៌បានទេ។

### តើវាដំណើរការបានល្អយ៉ាងដូចម្តេច?

ការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូនដំណើរការ បានល្អណាស់។ វាមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាង 99% ។

### តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមានការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូន?

វិធីសាស្ត្រជាទូទៅបំផុតហៅថាការគ្រៀមបំពង់ស្បូនពិក (Laparoscopic Sterilisation) ។ ជាមួយនឹង វិធីសាស្ត្រនេះស្រ្តីជាធម្មតាត្រូវមានការចាក់ថ្នាំជាទូទៅធ្វើអោយស្លឹក និងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយយប់។ វេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការកាត់ចំណុះនៅក្នុងពោះ។ បន្ទាប់មកឡាប៉ារ៉ូស្កូប (គឺជាកែវយិតតូចមួយ) ត្រូវដាក់បញ្ចូល ហេតុនេះវេជ្ជបណ្ឌិតអាចមើលឃើញ បំពង់។ បំពង់ត្រូវបានបិទជាមួយខ្នាស់ក៏ប រង្វង់កង ឬដោយការកាត់ ឬការចង។ វិធីសាស្ត្រកាន់តែថ្មីមួយទៀតហៅថា Essure® ។ ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះ វត្ថុតូចៗសំរាប់ដាក់បញ្ចូលត្រូវបានដាក់នៅក្នុង ដៃស្បូននីមួយៗតាមរយៈទ្វារមាសនិងកស្បូន។ ជាមួយនឹង Essure® គ្មានការរំលោភបំពានទេ ហើយវាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការប្រើថ្នាំ ស្លឹក។ វាចំណាយពេលបរិច្ចាគ 30 នាទី ហើយស្រ្តីជាច្រើនអាចទៅ ផ្ទះវិញមួយម៉ោងក្រោយមក។



### ការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូន

ក្រោយពីមានការប្រើថ្នាំស្លឹកទូទៅមក អ្នកអាចមានដំណើរចងក្អង (មានអារម្មណ៍ឈឺ) ឬមានភាពឆ្លើយហត់អស់ពេលពីរបីថ្ងៃ។ ក្រោយពីមានឡាប៉ារ៉ូស្កូប អ្នកអាចមានការឈឺខ្លះនៅក្នុងពោះនិងស្មារ របស់អ្នក។ ជាធម្មតាវាត្រូវការពេលប្រាំពីរថ្ងៃសំរាប់ស្រ្តីដើម្បីមានអារម្ម ណ៍ល្អឡើងវិញ។ ស្រ្តីទាំងឡាយដែលធ្វើតាមនីតិវិធី Essure® ជាមួយនឹង ថ្នាំស្លឹកជាធម្មតាជាសះស្បើយវិញកាន់តែលឿន។

### តើវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលណា?

វិធីសាស្ត្រឡាប៉ារ៉ូស្កូបពិក អ្នកនឹងត្រូវបានការពារមិនអោយមានកូនភ្លាម តែម្តង។ វិធីសាស្ត្រ Essure® ជាធម្មតាប្រើពេលបីខែដើម្បីដំណើរការ ក៏ប៉ុន្តែវាអាចប្រើពេលកាន់តែយូរ។ អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដទៃក្នុងការមិនអោយមានកូន រហូតដល់ការ ធ្វើតេស្តបង្ហាញថាបំពង់ត្រូវបានទប់បិទពេញលេញ។

### តើមានផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំឬទេ?

ជាមួយនឹងការកាត់ណាមួយ អ្នកអាចមានការស្មុគស្មាញ ដូចជាការហូរឈាមនិងការឆ្លងជំងឺ ក៏ប៉ុន្តែការស្មុគស្មាញទាំងនោះមិន កើតមានជាទូទៅទេ។

### តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការ?

ការកាត់ប្រហែលពីរ ទៅប្រាំបួននៅក្នុងចំណោមការកាត់ចំ នួន 1,000 បានបរាជ័យ។ វាអាចកើតឡើងសូម្បីប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយ មក។ ប្រសិនបើវា បរាជ័យ វាមានឱកាសកាន់តែច្រើននៃការមានគភ៌ ការធ្វើជាកស្បូន (នៅខាងក្រៅស្បូន)។

### តើការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូនអាចត្រូវប្តូរបញ្ជាសវិញ ទេ?

ជូនកាលការគ្រៀមបំពង់ស្បូនពិកអាចផ្តល់ផល បញ្ជាសមកវិញ ក៏ប៉ុន្តែទោះបីដូចនោះមានស្រ្តីតែ 50% ប៉ុណ្ណោះដែលក្លាយជាមានគភ៌។ វាក៏មាន ហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ផងដែរនៃការមានគភ៌តាម កស្បូន។ វិធីសាស្ត្រ Essure® មិនអាចផ្តល់ផល បញ្ជាសមកវិញទេ។ ប្រសិនបើស្រ្តីម្នាក់គិតថាមានឱកាសណាមួយដែលនាងអាចចង់មានកូ ននៅក្នុងពេលអនាគត នាងមិនត្រូវមានការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយ មានកូន។ វា ល្អបំផុតមិនត្រូវធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្តមួយបែបនេះទេ ប្រសិន បើអ្នកស្ថិតនៅក្រោមភាពតឹងតែង ដូចជាគ្រាន់តែក្រោយពីមានទារក ឬការរលូតកូន ឬ នៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាដទៃទៀត។

[www.fpnsw.org.au](http://www.fpnsw.org.au) | ទូរស័ព្ទសេវាអនាមិក 1300 658 886 | ចាប់ផ្តើមនៅ  
សេវាភ្នំនិច & ព័ត៌មាន | ការអប់រំ & ការបណ្តុះបណ្តាល | ការស្រាវជ្រាវ | ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ  
ផែនការគ្រួសារ NSW គឺជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយក្រសួងសុខាភិបាល នៃរដ្ឋ NSW

ព័ត៌មាននៅក្នុងក្រដាសអង្គហេតុនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់គោលបំណងអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។ FPNSW បានប្រកាន់យកនូវលក្ខណៈប្រយោជន៍ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានគឺមានភាពត្រឹមត្រូវនិង មានសម័យនៅពេលវេលានៃការបោះពុម្ពផ្សាយ។ បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តពូជផ្ទាល់ខ្លួន ឬ បញ្ហាសុខភាពមធ្យម ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីអោយស្វែងរកដំ បូន្មាននិងជំនួយគាំទ្រពីអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ ឬទស្សនាភ្នំនិចផែនការគ្រួសារ។  
ព័ត៌មានលើកឡើងវិញ៖ មិថុនា 2014/FPNSW 06/14



**តើអ្នកទទួលបានការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូនយ៉ាងដូចម្តេច?**

ការគ្រៀមបំពង់ស្បូនមិនអោយមានកូនអាចត្រូវរៀបចំចាត់ចែងតាមរយៈវេជ្ជបណ្ឌិតនៅតាម មូលដ្ឋាន គ្រូពេទ្យជំនាញខាងពេទ្យស្ត្រី ផ្នែកមន្ទីរពេទ្យគាំពារ ឬគ្លីនិកផែនការគ្រួសារ។ សំរាប់ ព័ត៌មានស្តីពី Essure® សូមមើលទៅ [www.essure.com](http://www.essure.com)

**សំរាប់ព័ត៌មានថែមទៀត**

- ទាក់ទងផែនការគ្រួសារ NSW តាមខ្សែទូរស័ព្ទនិយាយលេខ 1300 658 886 ឬ មើល [www.fpnsw.org.au/talkline](http://www.fpnsw.org.au/talkline)
- NRS (សំរាប់អ្នកថ្លង់) 133 677
- ឬទស្សនាគ្លីនិកផែនការគ្រួសារដែលជិតបំផុតរបស់អ្នក

[www.fpnsw.org.au](http://www.fpnsw.org.au) | ខ្សែទូរស័ព្ទនិយាយ 1300 658 886 | ហាងលក់សៀវភៅ

សេវាគ្លីនិក & ព័ត៌មាន | ការអប់រំ & ការបណ្តុះបណ្តាល | ការស្រាវជ្រាវ | ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ  
ផែនការគ្រួសារ NSW គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយក្រសួងសុខាភិបាល នៃរដ្ឋ NSW

ព័ត៌មាននៅក្នុងក្រដាសអង្វរហេតុនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់គោលបំណងអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។ FPNNSW បានប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ប្រយោជន៍ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានគឺមានភាពត្រឹមត្រូវនិងទាន់សម័យទៅលើពេលវេលានៃការបោះពុម្ពផ្សាយ។ បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តពូជផ្ទាល់ខ្លួន ឬ បញ្ហាសុខភាពរួមគ្នា ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីអោយស្វែងរកដំបូន្មាននិងជំនួយគាំទ្រពីអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ ឬទស្សនាគ្លីនិកផែនការគ្រួសារ។  
ព័ត៌មានលើកឡើងវិញ៖ មិថុនា 2014/FPNSW 06/14



## Fact Sheet - English

# TUBAL STERILISATION



### What Is Tubal Sterilisation?

Tubal sterilisation is an operation that women can have so that they cannot become pregnant. It is a permanent form of contraception.

### How Does Tubal Sterilisation Work?

The operation blocks a woman's Fallopian tubes so that the sperm cannot travel up to meet the ovum (egg) and start a pregnancy.

### How Well Does It Work?

Tubal sterilisation works very well. It is more than 99% effective.

### What Happens When You Have A Tubal Sterilisation?

The most common method is called Laparoscopic Sterilisation. With this method women usually have a general anaesthetic, and stay overnight in hospital.

The doctor makes one or two small incisions in the abdomen. Then a laparoscope (a tiny telescope) is inserted so the doctor can see the tubes. The tubes are closed off with clips, rings, or by cutting and tying. A newer method is called Essure®. With this method small micro-inserts are placed in each Fallopian tube through the vagina and cervix.

With Essure® there are no incisions and it can be done under a local anaesthetic. It takes about 30 minutes and most women can go home after about one hour.

### After A Tubal Sterilisation

After a general anaesthetic you may have nausea (sick feeling) or tiredness for a couple of days.

After laparoscopy, you may have some pain in your abdomen and shoulder. It usually takes about seven days for a woman to feel quite well again. Women who have the Essure® procedure with a local anaesthetic usually recover more quickly.

### When Will It Be Effective?

For laparoscopic methods you will be covered for contraception right away. The Essure® method usually takes three months to work, but it may take longer.

You should use another method of contraception until tests show that the tubes are fully blocked.

### Are There Any Side Effects?

With any operation, you can have complications such as bleeding and infection, but they are not common.

### What If It Doesn't Work?


About two to nine in 1,000 operations fail. It can happen even years later. If it fails there is more chance of a pregnancy being ectopic (outside the uterus).

### Can Tubal Sterilisation Be Reversed?

Sometimes laparoscopic sterilisation can be reversed, but even then only about 50% of women become pregnant. There is also a higher risk of ectopic pregnancy. The Essure® method cannot be reversed.

If a woman thinks there is any chance she may want a child in the future she should not have tubal sterilisation. It is best not to make such a big decision if you are under stress, such as just after having a baby, or a miscarriage, or when you have other problems.

## TUBAL LIGATION



[www.fpnsw.org.au](http://www.fpnsw.org.au) | talkline 1300 658 886 | [bookshop](#)

clinical services & information | education & training | research | international development

Family Planning NSW is a not-for-profit organisation funded by the NSW Ministry of Health

The information in this Fact Sheet has been provided for educational purposes only. FNPNSW has taken every care to ensure that the information is accurate and up-to-date at the time of publication. Individuals concerned about any personal reproductive or sexual health issue are encouraged to seek advice and assistance from their health care provider or visit a Family Planning Clinic. Reviewed May 2014/FPNSW 05/14

## How Do You Get A Tubal Sterilisation?

A tubal sterilisation can be arranged through a local doctor, a gynaecologist, a hospital outpatient department or Family Planning clinic. For information on Essure® go to [www.essure.com](http://www.essure.com)

## For Further Information

- Contact the Family Planning NSW Talkline on 1300 658 886 or go to [www.fpnsw.org.au/talkline](http://www.fpnsw.org.au/talkline)
- NRS (for deaf) 133 677
- Or visit your nearest Family Planning clinic

Reviewed: June 2014 | FPNSW 06/14

*The information in this Factsheet has been provided for educational purposes only. Family Planning NSW has taken every care to ensure that the information is accurate and up-to-date at the time of publication. Individuals concerned about any personal reproductive or sexual health issue are encouraged to seek advice and assistance from their health care provider or visit an Family Planning NSW clinic.*

[www.fpnsw.org.au](http://www.fpnsw.org.au) | [talkline 1300 658 886](tel:1300658886) | [bookshop](#)

clinical services & information | education & training | research | international development

Family Planning NSW is a not-for-profit organisation funded by the NSW Ministry of Health

Family Planning QLD 07 3250 0240 | Family Planning TAS 03 6273 9117 | Family Planning VIC 03 9257 0121

Family Planning WA 08 9227 6177 | Family Planning Welfare Association of NT 08 8948 0144

Sexual Health and Family Planning ACT 02 6247 3077 | SHine SA 08 8300 5300